

Was Sie zur Corona-Schutzimpfung für Ihr Kind wissen sollten

Informationen für Eltern und Sorgeberechtigte

Diese **Informationen** gibt es auch in **Leichter Sprache** und in **Fremdsprachen**.



In diesem Merkblatt finden Sie wichtige Informationen zur **Corona-Schutzimpfung für 12- bis 17-Jährige**. Diese Informationen und eine kleine Checkliste sollen Sie und Ihr Kind bei der Entscheidung zur Corona-Schutzimpfung unterstützen.

Stand: 28. März 2022

Warum ist die Corona-Schutzimpfung wichtig?

Die **Omikron**-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 ist **ansteckender** als andere Varianten und verbreitet sich sehr schnell. Kinder und Jugendliche haben **viele Kontakte** mit anderen Menschen und dadurch ein **hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken**.

Eine Corona-Schutzimpfung kann Ihr Kind vor **einer schweren Erkrankung an COVID-19 und möglichen Folgen** wie Long-COVID schützen.

Welcher Impfstoff und welche Impfabstände sind für mein Kind empfohlen?

Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren erfolgt die Corona-Schutzimpfung in Deutschland mit dem **mRNA-Impfstoff Comirnaty® der Firma BioNTech/ Pfizer** in derselben Dosierung wie bei Erwachsenen (30µg).

Bitte beachten Sie, dass der Schutz der Impfung erst einige Zeit nach der Impfung einsetzt.

Ist die Impfung für mein Kind empfohlen?

Ja. Die **Ständige Impfkommision (STIKO)** empfiehlt die Impfung **für alle 12- bis 17-Jährigen**.

Besonders von Vorteil ist die Impfung für Kinder und Jugendliche, auf die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:


- bei bestimmten **Vorerkrankungen**
- bei engem **Kontakt mit gefährdeten Personen**, die im Fall einer Ansteckung ein besonders hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben
- bei einem erhöhten **beruflichen Ansteckungsrisiko** oder **beim beruflichen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen**

Die Impfung soll **nach ärztlicher Aufklärung** zu Nutzen und Risiko erfolgen. Lassen Sie und Ihr Kind sich von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt beraten.



Mehr Infos zur Impfempfehlung finden Sie unter

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html



- 1 Wenn der empfohlene Abstand zwischen Impfungen überschritten wurde, kann die Impfserie fortgesetzt werden. Es muss nicht neu begonnen werden.
- 2 Für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wird eine erste Auffrischimpfung ab 3 Monaten und ohne Vorerkrankung zwischen 3 und 6 Monaten nach der letzten Impfung empfohlen.
- 3 Eine zweite Auffrischimpfung wird allen Menschen mit Abwehrschwäche ab 5 Jahren, Bewohnern und Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit erhöhtem Risiko in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (alle vorgenannten ab 3 Monate nach der letzten Impfung) sowie für Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen (ab 6 Monate nach der letzten Impfung) empfohlen.

Auffrischimpfung

Der **Schutz** durch die Impfung **lässt mit der Zeit nach**. Es kann dann zu Impfdurchbrüchen kommen. Von einem **Impfdurchbruch** spricht man, wenn eine vollständig geimpfte Person an COVID-19 erkrankt. Auch wenn man trotz einer Impfung an COVID-19 erkrankt, schützt die Corona-Schutzimpfung gut vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Mit einer Auffrischimpfung (Booster-Impfung) wird der **Impfschutz wieder gestärkt**.

Deshalb empfiehlt die STIKO für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren eine Auffrischimpfung mit dem **mRNA-Impfstoff Comirnaty®** in einem **Zeitfenster von 3 bis 6 Monaten** nach der ersten Impfserie. Für bestimmte Personengruppen wird eine **zweite Auffrischimpfung** empfohlen.

i Mehr Infos zur Auffrischimpfung finden Sie unter:

www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/



Was ist, wenn mein Kind bereits an COVID-19 erkrankt war?

Wenn Ihr Kind die Grundimmunisierung noch nicht abgeschlossen hat:

- Hat Ihr Kind sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt bzw. war an COVID-19 erkrankt, dann ist in der Regel **eine Impfdosis nach etwa 3 Monaten** empfohlen.
- Es kann auch vorkommen, dass man sich **nach der ersten Impfung** mit dem Coronavirus ansteckt. Geschieht dies in den ersten 4 Wochen nach der Impfung, empfiehlt die STIKO eine zweite Impfung nach 3 Monaten.
- Die Impfung ist aber in manchen Fällen **bereits ab 4 Wochen** nach Abklingen der Krankheitszeichen möglich.

Eine Auffrischimpfung ist unabhängig vom Zeitpunkt der Ansteckung 3 bis 6 Monate nach der ersten Impfserie empfohlen.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie Fragen zur Corona-Schutzimpfung nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben.

Wie sicher ist die Corona-Schutzimpfung für mein Kind?

Alle Impfstoffe werden vor ihrer Zulassung **aufwendig** auf ihre Sicherheit **geprüft**. Auch nach ihrer Zulassung werden sie gründlich überwacht.

Die Impfstoffe sind in der Regel **gut verträglich**. Es kann zu üblichen **Impfreaktionen** wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Fieber kommen. Die Beschwerden klingen in der Regel nach wenigen Tagen wieder ab.

Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten; mehr Infos dazu finden Sie im stetig aktualisierten [Aufklärungsmerkblatt zu mRNA-Impfstoffen](#) des Robert Koch-Instituts (RKI).

Wie bei allen Impfungen können in seltenen Fällen **allergische Reaktionen** auftreten. **Informieren Sie den Arzt oder die Ärztin** deshalb bitte vor der Impfung, ob Ihr Kind schon einmal allergisch reagiert hat.

Wo und wie kann ich mein Kind impfen lassen?

Sie können Ihr Kind in kinderärztlichen Arztpraxen, bei Betriebsärzten, in Impfzentren, bei Gesundheitsämtern oder bei Impfaktionen sowie in manchen Apotheken impfen lassen. In einigen Bundesländer können auch unter der [Rufnummer 116 117](#) Termine vereinbart werden. Die Impfung ist kostenlos.



Weitere Informationen auch für Ihr Kind und zur Corona-Schutzimpfung ab 5 Jahren finden Sie unter:

www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c15970



Weitere Informationen unter:

- ☑ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):
www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/
- ☑ Zusammen gegen Corona:
www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/
- ☑ Bundesministerium für Gesundheit:
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/
- ☑ Robert Koch-Institut:
www.rki.de

Checkliste

Folgende Checkliste kann Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen, gemeinsam eine Entscheidung über die Impfung zu treffen.

- ✓ Mein Kind ist 12 Jahre alt oder älter. Ja Nein
- ✓ Die Impfung ist für mein Kind besonders von Vorteil, da es an einer Vorerkrankung leidet. Bei dieser Vorerkrankung empfiehlt die STIKO die Corona-Schutzimpfung besonders. Ja Nein
- ✓ Mein Kind hat engen Kontakt zu gefährdeten Personen. Diese Personen haben im Fall einer Corona-Infektion ein besonders hohes Risiko, schwer zu erkranken. Ja Nein
- ✓ Mein Kind hat aufgrund der Ausbildung oder arbeitsbedingt ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Oder es hat beruflichen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen. Ja Nein
- ✓ Mein Kind möchte sich gerne durch eine Corona-Schutzimpfung vor einer schweren Erkrankung an COVID-19 und möglichen Folgen schützen. Ich habe mit meinem Kind in Ruhe über die Corona-Schutzimpfung gesprochen. Ja Nein



Wieso sind die Hygieneregeln für Geimpfte und Ungeimpfte weiterhin so wichtig?

Die Corona-Schutzimpfung **schützt gut vor einem schweren Krankheitsverlauf**. Sie kann aber keinen hundertprozentigen Schutz bieten.

Es bleibt **auch für Genesene und nach der Impfung** wichtig, auf die **AHA+L+A-Formel** zu achten: **A**bstand halten, **H**ygiene beachten, **A**lltag mit Maske, **L**üften und die **Corona-Warn-App** nutzen. Bei Krankheitszeichen sollte man unbedingt seine Kontakte einschränken und **Corona-Tests** machen. Man kann das Coronavirus aber auch ohne Krankheitszeichen übertragen und andere Menschen anstecken.

Noch Fragen? Weiterführende Angebote der BZgA:



[infektionsschutz.de/
corona-schutzimpfung](https://www.infektionsschutz.de/corona-schutzimpfung)



facebook.com/bzga.de



0800 232 27 83
kostenlose Telefonberatung der BZgA



www.bzga-k.de/youtube